

Vragen?

Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen u graag verder.

We wensen u een spoedig herstel toe.

Contact

Secretariaat Neus-, keel-en oorziekten:
056/ 62 35 38

Telefoonnummer spoed: 056/ 62 31 31



Infobrochure
NEUS-, KEEL-EN OORZIEKTEN

Auteur: Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Publicatiedatum: September 2019
Doc: 5892

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Conchoplastie

verkleinen van de onderste neusschelp

De functie van de neus

De neus is voornamelijk een ademhalingsorgaan. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Op deze manier wordt ±90% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, weggefilterd en onschadelijk gemaakt. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de reukzin, de stemvorming en de afvloeit van traanvocht.

Anatomie van de neus

Elke neushelft bestaat uit drie slijmvliesplooien die boven elkaar zitten. Dit noemen we de neusschelpen. De onderste neusschelpen zijn het grootst en geven vaker klachten dan de andere. Bij een verkoudheid of allergie zullen de neusschelpen opzwellen. Dit leidt tot neusverstopping.

Indicatie van conchoplastie

Indien u voortdurend last heeft van neusverstopping kan het zijn dat u forse neusschelpen heeft. Soms blijven de onderste neusschelpen chronisch gezwollen na een verkoudheid of allergische reactie. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. De arts zal u medicatie voorschrijven om de zwelling te verminderen.



Indien deze weinig of geen effect hebben kan de NKO arts in overleg met u beslissen om een conchoplastie uit te voeren. Dit is een inwendige neusoperatie onder algemene narcose waarbij de te grote neusschelpen worden verkleind. Voor deze ingreep is een dagopname meestal voldoende en hoeft u dus niet te overnachten in het ziekenhuis.

Hoe gebeurt de ingreep?

Tijdens de operatie verwijdert de NKO-arts een reepje slijmvlies en bot van de onderste neusschelp in de linker en/of rechter neushelft. Er blijven geen zichtbare littekens over omdat deze ingreep aan de binnenzijde van de neus gebeurt. Aan het einde van de ingreep brengt de arts aan beide kanten van de neus een neustampon of wiek in, om nabloedingen te voorkomen en te beperken. Deze neustampons kunnen een drukkend gevoel geven en verstoppen de neus tijdelijk. Een conchoplastie gebeurt soms in combinatie met een septoplastie (= rechtzetten van het neustussenschot) of FESS (= sinusoperatie).

Wat gebeurt na het ontslag?

De eerste dagen na de ingreep kan de neus nog nabloeden. De eerste week na de ingreep moet u rustig blijven. Pas na twee dagen mag u de neus snuiten. Een controle afspraak wordt in overleg met de NKO arts geregeld.

Risico's

Bij deze ingreep is er nauwelijks sprake van risico's of complicaties. In een enkel geval kan de neus nabloeden.

Problemen

Telefoonnummer spoed: 056/ 62 31 31

Secretariaat Neus-, keel- en oorzaken:
056/ 62 35 38