



Infobrochure

Bronchoscopie

Geachte heer/mevrouw,

Dit infoblad heeft tot doel u te informeren over de procedure die u dient te ondergaan.

Deze folder bevat praktische informatie over de voorbereiding op het onderzoek, het onderzoek zelf en de verzorging nadien. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan u steeds terecht bij de pneumologie-verpleegkundigen of bij de verpleegkundigen van de afdeling waar u opgenomen bent.

Een bronchoscopie is een onderzoek van de grote luchtpijp en de andere luchtwegen. Er wordt een kijkinstrument of bronchoscoop ingebracht via de mond en via deze dunne flexibele slang met een lens of kleine videocamera op het einde kan de arts de luchtwegen inwendig onderzoeken. De reden van dit onderzoek zal de arts met u bespreken.

Voorbereiding op het onderzoek

BELANGRIJK OM TE MELDEN VÓÓR HET ONDERZOEK:

GEBRUIK VAN BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE

- Marcoumar, Marevan, Sintrom
- Aspirine, Asaflow, Plavix, Aggrenox, Ticlid, Clopidogrel
- Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana
- Spuitjes: Clexane, Fraxiparine, Innohep, ...

GEKENDE ALLERGIE VOOR MEDICATIE

- Vooral verdovingsmiddelen

ZWANGERSCHAP

Bij het plannen van het onderzoek zal nagegaan worden of u bloedverdunnende medicatie inneemt en wanneer en hoelang deze dient te worden onderbroken voor het onderzoek. Daarnaast kan er gevraagd worden nog bloed te laten afnemen.

U dient **nuchter** te zijn voor het onderzoek, dit wil zeggen: niet eten of drinken gedurende minstens 4 uur voor het onderzoek. Courante medicatie mag u wel innemen met een klein slokje water. Ook een puffer of een inhalator mag u nog gebruiken. Breng uw medicatielijst mee.

Draag geen nagellak of kunstnagels gezien dit de zuurstofmeting op de vingers verhindert. Indien u een kunstgebit heeft, dient u dit wel te verwijderen vlak voor het onderzoek. Voor het onderzoek zal mogelijks bij u een infuus geplaatst worden of een andere intraveneuze toegang. Dit gebeurt omdat men langs deze weg gemakkelijker medicatie kan toedienen. U zult eventueel een kalmeermiddel krijgen, dit in de vorm van een tabletje dat onder de tong zal smelten.

Waar gebeurt het onderzoek?

Endoscopielokaal op de afdeling **POLIKLINIEK INWENDIGE ZIEKTEN** (gelijkvloers)

Het onderzoek

De longarts en de pneumo-verpleegkundige begeleiden u tijdens het onderzoek.

U wordt in bed naar het onderzoekslokaal gebracht. Daar zult u volledig rechtop in bed mogen zitten. Bij ambulante patiënten zal het onderzoek gebeuren rechtop zittend op de onderzoekstafel. Gezien u tijdens het onderzoek moeilijker het speeksel uit de mond weggeslikt krijgt, zal er een doek op u gelegd worden om de slijmen uit de mond op te vangen.

Ook krijgt u tijdens het onderzoek een neusbrilletje op, waarlangs u wat zuurstof wordt toegediend. De verpleegkundige zal initieel vragen om de mond te openen en de tong uit te steken. De keel zal worden verdoofd met een verdovende spray om hoestreflexen tegen te gaan.

Deze spray heeft een bittere smaak, uw keel zal wat stijf aanvoelen en het slikken zal moeilijker verlopen doch dit hindert de ademhaling niet. Het geeft een gevoel vergelijkbaar met een tandverdooving. Nadien zal de verpleegkundige in overleg met de arts al dan niet medicatie inspuiten langs intraveneuze lijn. Vrij snel zult u zich wat slaperig voelen.

Hierna zal de arts u vragen de mond te openen en zal de endoscoop (dit is een zéér fijne soepele glasvezelsonde met op het uiteinde een camera) voorzichtig naar binnen gebracht worden. Tussen de tanden zal een bijtring worden geplaatst zodat u zich niet kunt kwetsen en u de endoscoop niet kunt stukbijten.

Het begin van het onderzoek is wat vervelend. De arts zal de endoscoop naar binnen brengen en de stembanden verdoven. U zult het gevoel hebben alsof u zich verslikt. [DIT IS HEEL NORMAAL.](#)

Eens de stembanden en de luchtpijp verdoofd zijn, verloopt het onderzoek heel vlot. U zult tijdens het onderzoek altijd genoeg adem hebben, belangrijk is ook dat u rustig in- en uitademt (best via de neus) en zo weinig mogelijk hoest. Soms wordt er slijm opgezogen of wordt een spoeling van de kleine luchtwegen uitgevoerd.

Eventueel worden er bipten (dit zijn kleine stukjes weefsel) genomen of wordt er gespoeld met fysiologisch voor nader onderzoek. Hiervan zult u niets voelen.

Wanneer u zich tijdens de procedure toch oncomfortabel zou voelen, verwittig dan gerust de verpleegkundige of arts door uw hand op te steken. Het hele onderzoek is pijnloos (longen zijn niet-pijngevoelig) en duurt maximum een 15 tal minuten.

Een bronchoscopie lijkt op het eerste gezicht een vervelende procedure, maar dankzij de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden verloopt het onderzoek meestal zonder al te veel hinder.

Nazorg

Als het onderzoek afgelopen is zult u zich misschien nog wat slaperig voelen en zal uw keel nog verdoofd aanvoelen. Na het onderzoek wordt u nog even opgevolgd tot u zich goed genoeg voelt om huiswaarts te keren of terug naar uw kamer te gaan.

U wacht zeker 1 à 2 uur vooraleer iets te drinken of te eten gezien de kans op verslikken en ook blijft u best nog een uurtje in bed tot het kalmeermiddel volledig is uitgewerkt. Na de wachttermijn start u met een slokje water. Als u goed kan slikken, mag u weer eten.

Ambulante patiënten dienen zich te laten vervoeren door een familielid/kennis gezien u de dag van het onderzoek in geen geval zelf met de wagen mag rijden of een machine besturen. De verdoving kan een invloed hebben op uw reactievermogen.

Ook zult u mogelijks gedurende een aantal uren nog wat zuurstof toegediend krijgen via het neusbrilletje.

Als er stukjes genomen zijn, is het mogelijk dat u de eerste uren na het onderzoek wat bloederige secreties ophoest. **Dit is normaal.**

Mogelijks kan u wat temperatuursverhoging hebben naar de avond toe, hiervoor kan u een koortswerend middel innemen. De volgende dag moet de koorts verdwenen zijn.

Mocht u de uren na het onderzoek kortademig worden of een druk/benaamd gevoel thv de borstkas ervaren consulteert u best een arts.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht op het secretariaat inwendige geneeskunde.

Telefoon: **056/ 62 35 16**

Dr. Sarah Bostoën
Dr. Elyne Cottignies

Toestemming voor het onderzoek

Ik,

.....

geef hierbij toestemming tot het uitvoeren van een bronchoscopie.

Op datum: / /

Handtekening:



Contact

Secretariaat inwendige geneeskunde: 056/ 62 35 16

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Auteur: Dienst Pneumologie
Publicatiedatum: Oktober 2016
Doc: 5894

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be