

Vragen?

Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen u graag verder.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.

Publicatiedatum : februari 2016 – versienummer 01

Opgemaakt door : dienst pediatrie

Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11



Infobrochure
KINDERGENEESKUNDE

Auteur: Dienst Kindergeneeskunde
Publicatiedatum: November 2016
Doc: 5899

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be



Chalazion

Inleiding

Een chalazion of gerstekorrel is een verstopte talgklier (kliertje van Meibom) aan de binnenkant van het ooglid.

De talg kan niet meer naar buiten komen en hoopt zich op in het kliertje. Het is een steriele ontsteking, die soms gespaard kan gaan met een bacteriële bijbesmetting.

Behandeling

Initieel wordt geprobeerd om het chalazion te behandelen met zalf en druppels. Indien dit onvoldoende effect heeft wordt het weggenomen onder verdoving, door het insnijden van het ooglid.

Aan de binnenzijde van het ooglid wordt een sneetje in de zwelling gemaakt waarna de inhoud met een lepeltje wordt verwijderd.

Het is belangrijk dat de binnenbekleding van de talgklierzwelling ook wordt verwijderd om de kans om opnieuw optreden van een chalazion te verkleinen. De operatie duurt 10 -15 minuten. Men kan chalazion meerdere malen als nodig laten verwijderen. Er zijn weinig risico's verbonden aan de ingreep, er kan een blauw oog optreden en er zijn natuurlijk de gekende risico's van de anesthesie. De slaagkansen zijn heel hoog maar niet 100%. Tijdens de anesthesie wordt pijnstilling gegeven door de anesthesist.

Nazorg

Ook na de behandeling blijft het belangrijk om de ooglidranden goed schoon te houden om de kans op nieuw chalazion te verminderen. Dit doe je door je wimpers te reinigen met lauw water en babyshampoo. Het kind mag na de ingreep naar school/opvang. Ook mag er een badje gegeven worden.

Na de behandeling wordt antibioticazalf aangebracht ter preventie van ontsteking. Bij pijn mag paracetamol gegeven worden volgens gewicht van het kind.

