

## Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, kan u altijd terecht op **056/62 35 28**.

Verder zal het personeel zorgen dat het onderzoek zo aangenaam en comfortabel mogelijk verloopt.

## Contact

Secretariaat nucleaire geneeskunde:  
056/ 62 35 28

Telefoonnummer onthaal:  
056/ 62 31 11



Infobrochure  
NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Auteur: Dienst Nucleaire Geneeskunde  
Publicatiedatum: Maart 2016  
Doc: 6174

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem  
Vijfseweg 150  
8790 Waregem  
T. 056/ 62 31 11  
F. 056/ 62 30 20  
E. info@ziekenhuiswaregem.be

# Voorschriften

voor  
patiënten met jonge kinderen en  
moeders die borstvoeding geven

Geachte patiënt(e),

Door uw arts werd een onderzoek aangevraagd op de dienst “Nucleaire geneeskunde”. Dit betekent dat een lage dosis radioactief product wordt toegediend via een ader. Voor u persoonlijk stelt dit geen probleem. Het vormt wel een probleem voor de baby of peuter, omdat die nog klein is en door het vele lichamelijke contact ook een lage, maar meetbare hoeveelheid straling op zich kan krijgen. Dit wensen we uiteraard zoveel mogelijk te vermijden.

U kan hiervoor zelf een aantal maatregelen nemen. De duur van deze maatregelen hangt af van het type onderzoek dat u krijgt en bedraagt maximaal 1 dag.

Algemeen geldt dat afstand houden (minstens 1 meter) en het beperken van de duur van de contacten de beste bescherming bieden.

## Uw kindje neemt enkel flesvoeding

De voeding laat u beter door iemand anders geven omdat dit toch een behoorlijk lang en nauw contact betekent.

## U geeft borstvoeding, al dan niet in combinatie met flesvoeding

Een kleine hoeveelheid van het product dat u wordt toegediend, gaat naar de moedermelk (net als vele andere medicamenten), waardoor ook de baby een weliswaar kleine dosis straling zou krijgen. Dit moet zeker vermeden worden.

Hiervoor is het nuttig gedurende enkele uren tot maximaal 24u de melk af te kolven en weg te gooien (niet invriezen) en de baby tijdelijk flesjes te laten geven. Het is ook beter om deze vervangflesjes door iemand anders te laten geven.

## Kindje neemt reeds vaste voeding

Vooraf de eerste uren na de injectie is het belangrijk om de voeding door iemand anders te laten geven. Nadien stelt dit minder probleem, omdat de afstand tussen u en uw kindje groter is dan bij flesvoeding.

## Verzorging van de baby

Een korte verzorging van de baby zoals bij het vervangen van een pamber kan.

Langere contacten zoals het geven van het badje of het vertellen van verhaaltjes in bed worden best vermeden de eerste 12uur na injectie. Nadien stelt dit minder problemen

Verder is het belangrijk om voldoende te drinken en naar het toilet te gaan om de kwaliteit van de beelden te verhogen maar ook om het overschot aan activiteit sneller weg te werken.

**U ZORGT OOK VOOR EEN GOEDE HANDHYGIËNE.**