

Complicaties

Algemene complicaties (dwz van elke ingreep):
nabloeding en wondinfectie.

Specifieke – meestal tijdelijke - complicaties bij deze ingreep:

- te laag kalkgehalte in het bloed. Dit kan geremedieerd worden met calciumsupplementen.
- letsel van de stembandzenuw met als resultaat een hese stem.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht op het secretariaat Neus-, keel-en oorziekten.

Telefoon: **056/ 62 35 38**

Contact

Secretariaat Neus-, keel-en oorziekten
056/ 62 35 38

Telefoonnummer spoed:
056/ 62 31 31



Infobrochure
NEUS-, KEEL-EN OORZIEKTEN

Auteur: Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Publicatiedatum: September 2019
Doc: 6752

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Totale thyroidectomie of hemithyroidectomie

Verwijderen van de volledige of halve schildklier

Wat is de schildklier ?

De schildklier (thyroid) is een vlindervormige klier aan de voorzijde van de hals, onder het niveau van het strottenhoofd en tegen de luchtpijp. De schildklier produceert schildklierhormoon (=motorregeling voor het lichaam). De klier bestaat uit 2 kwabben, die op de middellijn verbonden zijn. Achter de schildklier liggen aan elke kant 2 bijschildklier-tjes (die het kalkgehalte in het bloed regelen) en een zenuw (die naar de stembanden gaat). De schildklier wordt door 4 slagaders van bloed voorzien en is hierdoor het meest doorbloede orgaan van ons lichaam.

Wanneer wordt de schildklier verwijderd?

Het uitgebreide schildklieronderzoek en het stellen van de indicatie tot operatie gebeurt door de endocrinoloog. De schildklier kan geheel of gedeeltelijk verwijderd worden (totale thyroidectomie of hemithyroidectomie) in functie van de gevonden afwijking(en):

- De schildklier werkt te hard (hyperthyroidie) & medicatie geeft geen blijvende oplossing
- De schildklier heeft 1 knobbel: "warme" knobbel bij hyperthyroidie of "koude" knobbel bij een gezwel
- De schildklier heeft meerdere knobbels, waardoor deze groter wordt en hinder veroorzaakt bij slikken en/of ademen, alsook esthetische hinder.

Vorbereiding op de ingreep

Na overleg met de behandelende arts heeft u ingestemd met een ingreep. Omdat de ingreep onder algemene narcose plaatsvindt, mag u vanaf middernacht niets meer eten of drinken. Het innemen van medicatie wordt best met de arts afgesproken.

Opname op de dienst hospitalisatie

- Opname in de vroege ochtend in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.
- De ingreep is voorzien in het operatiekwartier rond de middag.
- Het ontslag is voorzien op dag 2 of 3 postoperatief in functie van herstel.

Hoe wordt de schildklier verwijderd?

De wegname van de schildklier gebeurt door een horizontale snede laag in de hals. Tijdens de operatie worden alle bloedvaten naar de schildklier onderbonden. De bijschildklier-tjes en de stemband-zenuw(en) worden opgezocht en voorzichtig van de schildklier gedissecteed.

Na de ingreep

Na de ingreep voelt u wat pijn bij het slikken, waarvoor pijnmedicatie wordt voorzien. Soms kan de stem in het begin wat hees zijn. Tijdens uw verblijf wordt het kalkgehalte in het bloed dagelijks nagekeken. Indien nodig zal u extra kalk (Calcium) dienen in te nemen tot de werking van de bijschildklier-tjes volledig is genormaliseerd. Tevens wordt de drainage van het wondvocht via een slangetje (redon) gecontroleerd en opgevangen gedurende één of enkele dagen.

U kan het ziekenhuis verlaten vanaf de 2^{de} tot de 4^{de} dag na de operatie. Dit hangt vooral af van de uitgebreidheid van de ingreep, het kalkgehalte in het bloed en het verwijderen van de redon(s).

De arbeidsongeschiktheid bedraagt 3 à 4 weken (in functie van de specifieke werkomstandigheden). Het

is belangrijk om geen lasten te tillen of ander zwaar werk te verrichten in deze periode.

Na een schildklieroperatie is het noodzakelijk om blijvend schildklierhormoon in te nemen. Dit wordt (meestal) pas opgestart na de 1^{ste} controle (1 week na de operatie). Deze medicatie heeft geen bijwerkingen in de juiste dosage en is een lichaamseigen product. De endocrinoloog regelt deze medicatie (eerste nazicht 6 weken postoperatief).

